



## TORMENTA®

*Insecticida agrícola*

Producto registrado: **RSCO-INAC-0119-0691-009-2.8 (SIDELT®)**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b> <b>DELTAMETRINA:</b> (S)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2 dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 25 g de i. a. /L. a 20 °C)	2.80
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Emulsificante, surfactantes, acidificante, antioxidante, sinergista, solvente, impurezas y compuestos relacionados.	97.20
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

Producto registrado: **RSCO-INAC-0119-0691-009-2.8 (TORMENTA®)**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b> <b>Mezcla de Benzoato de Emamectina B1a y Benzoato de Emamectina B1b (con un contenido no menor de 94.16% de Benzoato de Emamectina B1a y no mayor de 2.24g de Benzoato de Emamectina B1b):</b> (Equivalente a 19.20 g de i. a. /L. a 20 °C)	2.02
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Diluyente, co-solventes, conservador y emulsificantes.	97.98
<b>TOTAL</b>	100.00

**“PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN”**  
**“PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL”**  
**“PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA”**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.**



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Recomendación de uso del paquete TORMENTA®.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MODO DE APLICACIÓN
Maíz (1)	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> ) Gusano elotero ( <i>Helicoverpa zea</i> )	1 paquete / ha	Iniciar aplicaciones cuando se observen las primeras larvas en el cultivo
Sorgo	Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> )	1 paquete / ha	Iniciar aplicaciones cuando se observen las primeras larvas en el cultivo

\*( ) : **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.**

**LMR (Límite máximo de residuos):**

CULTIVO	LMR (mg/kg)		FUENTE
Maíz Sorgo	0.5	Deltametrina	EPA*
Maíz Sorgo	0.1	Benzoato de Emamectina B1a y B1b	Unión Europea

\*Environmental Protection Agency

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

www.dragon.com.mx