



SIDELT®

Insecticida agrícola

Concentrado Emulsionable.

Producto registrado: **RSCO-INAC-0119-0691-009-2.8**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: DELTAMETRINA: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2 dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 25 g de i. a. /L. a 20 °C)	2.80
INGREDIENTES INERTES Emulsificante, surfactantes, acidificante, antioxidante, sinergista, solvente, impurezas y compuestos relacionados.	97.20
TOTAL	100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, **PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

SIDELT® es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto sobre el sistema nervioso de los insectos. Se recomienda aplicarse en los cultivos y para el control de las plagas que se indican en el siguiente cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS ml/ha	OBSERVACIONES
Limonero (SL)* Lima (SL) Mandarino (SL) Naranja (SL) Tangerina (SL) Toronjo (SL)	Psílido asiático de los cítricos (<i>Diaphorina citri</i>)	500 – 600	Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 900 - 1000 L de agua/ha..
Algodonero (1)	Gusano rosado del algodono (<i>Pectinophora gossypiella</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	500	Aplicación al follaje

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



	Medidor de la hoja del algodón (Alabama arguillacea) Perforador de la hoja del algodón (Bacculatrix thurberiella) Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) Gusano de la yema o Gusano de la yema del tabaco (Heliothis virescens)		
Soya (1)	Falso medidor de la soya (Pseudoplusia includens) Gusano peludo (Estigmene acrea) Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) Gusano bellotero (Helicoverpa zea) Gusano terciopelo (Anticarsia gemmatalis)	400-500	Aplicación al follaje
Papa (1)	Palomilla de la papa (Phthorimaea operculella)	500	Aplicación al follaje
Garbanzo (1)	Gusano bellotero (Helicoverpa zea)	400-500	Aplicación al follaje
Maíz (1)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	300	Aplicación al follaje
Tabaco (1)	Gusano de cuerno del tabaco (Manduca sexta) Gusano de la yema (Heliothis virescens)	500	Aplicación al follaje
Jitomate (1)	Gusano alfiler del tomate (Keiferia lycopersicella) Minador serpentina (Liriomyza munda) Gusano bellotero (Helicoverpa zea)	500	Aplicación al follaje
Frijol (1)	Conchuela del frijol (Epilachna varivestis) Gusano trozador (Agrotis sp) Gusano saltarín (Elasmopalpus lignosellus)	200-300	Aplicación al follaje

*(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite máximo de residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Limonero Lima Mandarina Naranja Tangerina Toronjo	0.05	Unión Europea.
Algodonero	0.2	EPA*
Soya	0.1	EPA
Papa	0.2	Unión Europea
Garbanzo	0.2	Unión Europea
Maíz	0.5	EPA
Tabaco	---	---
Jitomate	1.0	EPA
Frijol	0.2	Unión Europea

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Con el equipo de protección puesto, llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora. Destape el frasco con cuidado. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua. Agite perfectamente y agregue dicha pre-mezcla al tanque o depósito de la aspersora, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente, volumen de aplicación de 900 – 1000 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES. No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores Instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD. No se recomienda **SIDELT®** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx