



HURACAN FORTE ALEADO

Herbicida Agrícola

Granulos Dispersables / Concentrado Emulsionable.

Producto registrado:

RSCO-HEDE-0276-307-034-060 / RSCO-MEZC-HEDE-0202-0233-X0031-009-40.92

COMPOSICION PORCENTUAL (ALEADO)	% EN PESO
------------------------------------	-----------

INGREDIENTE ACTIVO:

METSULFURÓN METIL: metil 2-(4-metoxi-6-metil- 1,2,5-triazin 2-4)-amino carbamoil sulfamoil) benzoato. (Equivalente a 600 g. de i.a./kg).	60.00
--	-------

INGREDIENTES INERTES

Surfactantes y portadores	40.00
---------------------------	-------

TOTAL	100.00
--------------	---------------

COMPOSICION PORCENTUAL (HURACÁN FORTE)	% EN PESO
---	-----------

INGREDIENTE ACTIVO:

AMETRINA: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazin-2,4-diamina (Equivalente a 345 g de i.a. /L a 20°C)	34.43
---	-------

HEXAZINONA: 3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,3,5-triazina-2,4(1H,3H)-diona (Equivalente a 65 g de i.a. /L a 20°C)	6.49
--	------

INGREDIENTES INERTES

Disolventes, Emulsificantes y Antiespumante	59.08
---	-------

TOTAL	100.00
--------------	---------------



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN. BANDA AZUL

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



HURACAN FORTE ALEADO es un herbicida sistémico al cultivo de caña que combina el poder de tres diferentes activos para lograr un excelente control de malezas, de hoja ancha y angosta de tipo manual.

El Control de malezas se aprecia 15 días después de la aplicación de Huracán Forte Aleado; inhibiendo además la germinación de nuevas generaciones de malezas. Ideal para productores que buscan una alternativa de control e malezas donde otras moléculas de uso actual están restringidas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Caña de azúcar	Arrocillo silvestre (<i>Echinochloa colona</i>) Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Ojo de perico (<i>Melampodium perfoliatum</i>)	2.0 - 4.0	Sin Limite	Realizar una aplicación en post emergencia dirigida a la maleza cuando esta tenga una altura menor a 15 cm, periodo de protección al menos 20 días; volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha

* **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: entrar a las áreas tratadas 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	Fuente
Caña de azúcar	0.01 (Metsulfuron metil)	EPA*
Caña de azúcar	0.05(Ametrina)	EPA
Caña de azúcar	0.6 (Hexazinona)	EPA

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO. Abrir el sobre con unas tijeras. Llenar el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada. Se recomienda diluir **HURACAN FORTE ALEADO** en agua limpia y agregarla al tanque de aplicación. Complete la capacidad del tanque sin dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr el cubrimiento completo del follaje. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersion usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES. No aplique este producto sin el equipo de protección adecuado. No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni a temperaturas muy altas (>35 °C). Aplicar en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. No aplicar en presencia de lluvia o cuando exista posibilidad de ésta para evitar que el producto sea lavado y contamine mantos acuíferos.



FITOTOXICIDAD. HURACAN FORTE ALEADO no es fitotóxico a las dosis y en el cultivo recomendado, si es aplicado de acuerdo a la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No utilizar **HURACAN FORTE ALEADO** en mezcla con insecticidas organofosforados, tampoco emplear este tipo de insecticidas 7 días antes y 7 días después de la aplicación de **HURACAN FORTE ALEADO**; no mezclar con fertilizantes líquidos que tengan pH menor o igual que 3.

Cuando se pretenda aplicar **HURACAN FORTE ALEADO** sólo o en mezcla con otros herbicidas autorizados para uso en potreros, es recomendable hacer una prueba previa, en una superficie pequeña antes de aplicarlo en todo el potrero, ya que puede ocasionar efecto letal en algunos pastos susceptibles o pastos recién establecidos de siembra directa o estolones, y después de la aplicación dejar pasar 2 meses para observar algún daño en el cultivo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx