



DIAZINON 25

Insecticida Agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado: **RSCO-INAC-0120-002-009-025**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
DIAZINON: 0,0 dietil-0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato. (Equivalente a 229 g de i. a./L a 20°C)	25.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes, emulsificantes y compuestos relacionados	75.00
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:4, **PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

DIAZINON 25 es un insecticida y/o acaricida organofosforado formulado como concentrado emulsionable. Actúa por contacto e ingestión. Se recomienda para el control de las siguientes plagas.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha
Algodonero (14)*	Trips (<i>Frankliniella</i> spp.) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Chinche manchadora (<i>Dysdercus</i> spp.) Chinche (<i>Chlorochroa ligata</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche café (<i>Euschistus servus</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaco</i>)	1.5 - 3.0
Melón (3) Sandía (3) Pepino (7)	Diabroticas (<i>Diabrotica</i> spp.) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp.)	1.0 - 1.5

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



	Chicharritas (<i>Empoasca</i> sp.) Pulgón (<i>Aphis gossypii</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.)	
Apio (10)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp.) Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp.)	1.0
Caña de Azúcar (28)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) Pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>) Barrenador (<i>Chilo loftini</i>)	1.0 - 1.5
Cebolla (10)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> sp.) Gusano de la cebolla (<i>Hylemia antiqua</i>) Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp.)	1.0 - 1.5
Chícharo (21)	Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza pusilla</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> sp.) Araña roja (<i>Tetranychus</i> sp.)	1.0 - 1.5
Chile (10)	Pulgones (excepto <i>Myzus</i>) (<i>Aphis</i> spp.) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.)	1.0 - 1.5
Frijol (7)	Picudo del ejote (<i>Apion godmani</i>) Chicharritas (<i>Empoasca</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Diabroticas (<i>Diabrotica</i> spp.) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.) Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0 - 1.5
Jitomate (1)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> sp.) Chinche pequeña (<i>Cyrtopeltis notatus</i>) Pulga negra (<i>Halticus</i> sp.) Pulgón (<i>Macrosiphum solanifolii</i>) Chicharrita (<i>Eutettix tenellus</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp.)	1.0 - 1.5
Lechuga (14)	Pulgón (<i>Brevicoryne brassicae</i> , <i>Aphis</i> spp.) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.0 - 1.5
Maíz (SL)	Araña roja (<i>Oligonychus mexicanus</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>) Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Chapulines (<i>Melanoplus</i> spp.)	1.0 - 1.5
Alfalfa (7)	Pulgón manchado (<i>Therioaphis maculata</i>) Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>) Chicharritas (<i>Aceratagallia curvata</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp.)	1.0 - 1.5
Cacahuete (21)	Trips (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0
Fresa (5)	Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp.) Pulgones (<i>Pentatrichopus</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes</i> sp.) Trips (<i>Thrips</i> spp.)	4.0 - 5.0
Durazno (20) Ciruelo (10)	Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Frailecillo (<i>Macroductylus</i> spp.)	150 - 200 ml/ 100 L de agua
Higo (10)	Chinche de encaje (<i>Corythucha</i> spp.) Escama algodonosa (<i>Icerya purchasi</i>) Escama roja de california (<i>Aonidiella aurantii</i>)	150 ml / 100 L de agua

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Manzano (14) Peral (14)	Pulgón lanígero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Frailecillo (<i>Macroductylus</i> sp.) Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>) Trips (<i>Frankliniella insularis</i>)	100 – 150 ml/ 100 L de agua
Pastos (21)	Mosca pinta (<i>Aeneolamia postica</i>) Chinche de los cereales (<i>Blissus leucopterus</i>) Chicharrita (<i>Dalbulus elimatus</i>)	1.0 - 1.5
Piña (30)	Piojo harinoso (<i>Dysmicoccus brevipes</i>)	150 ml/100 L de agua
Plátano (0)	Trips (<i>Frankliniella parvula</i>)	150 ml/100 L de agua
Sorgo (7)	Mosca Midge (<i>Contarinia sorghicola</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>) Barrenador del tallo (<i>Diatraea</i> sp.) Chapulines (<i>Melanoplus</i> sp.)	1.0 - 1.5
Soya (7)	Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Chinche café (<i>Euschistus servus</i>) Chinche ligus (<i>Lygus</i> sp.) Chicharrita (<i>Empoasca</i> sp.)	1.0 - 1.5
Tabaco (21)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.)	1.5
Trigo (7)	Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>) Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>)	1.5

*Realizar una aplicación al follaje; volumen de aplicación 900-1000 L de agua/ha.

**Realizar dos aplicaciones, al follaje, a intervalos de 14 días; volumen de aplicación 600-700 L/ha.

***Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Alfalfa	0.02	Unión Europea
Algodonero	0.02	Unión Europea
Apio	0.70	Unión Europea
Cacahuete	0.02	Unión Europea
Caña de azúcar	0.01	Unión Europea
Cebolla	0.75	Unión Europea
Chicharo	0.01	Unión Europea
Chile	0.05	Unión Europea
Ciruelo	0.20	Unión Europea
Durazno	0.20	Unión Europea
Fresa	0.50	Unión Europea
Frijol	0.50	Unión Europea
Higo	0.50	Unión Europea
Jitomate	0.75	Unión Europea
Lechuga	0.70	Unión Europea
Maíz	0.01	Unión Europea
Manzano	0.50	Unión Europea
Melón	0.75	Unión Europea
Pastos	0.02	Unión Europea

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON

www.dragon.com.mx



Pepino	0.75	Unión Europea
Peral	0.50	Unión Europea
Piña	0.50	Unión Europea
Plátano	0.20	Unión Europea
Sandía	0.01	Unión Europea
Sorgo	0.01	Unión Europea
Soya	0.02	Unión Europea
Trigo	0.01	Unión Europea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Diluir la dosis recomendada en agua suficiente para proporcionar una cobertura uniforme.

CONTRAINDICACIONES: No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni en las horas de calor intenso (>35°C).

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD. No se recomienda **DIAZINON 25** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx