



## DRAGOZINA T®

*Herbicida Agrícola*

*Suspensión Acuosa*

Producto registrado: **RSCO-MEZC-HEDE-1260-X0001-008-22.7**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>ATRAZINA:</b> 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 250 g de i.a. /L a 25°C)	22.7
<b>TERBUTRINA:</b> N2-tert-butil-N4-etil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 250 g de i.a./L a 25°C)	22.7
<b>INGREDIENTES INERTES</b> Humectante, dispersante, antiespumante y diluyente	54.6
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCION**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**DRAGOZINA T®** es una mezcla de dos ingredientes activos, atrazina + terbutrina formulado como suspensión acuosa, esta excelente combinación se aplica en aspersión foliar para el control de malezas de hoja ancha y angosta.

La acción de este producto contra la maleza se basa en el bloqueo de la fotosíntesis. Atrazina actúa por absorción a través de la raíz, Terbutrina actúa al contacto por lo tanto, puede recomendarse contra maleza presente (menor de 5 cm de alto) y al mismo tiempo evita el brote de ésta.

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



CULTIVO	TIPO DE SUELO	DOSIS (L/ha)	PLAGA	MOMENTO DE APLICACIÓN
Sorgo (SL)*	Pesado (Vertisol)	4.0 a 5.0	<b>Hoja angosta</b> Tripa de pollo ( <i>Commelina diffusa</i> ), Zacate cadillo ( <i>Cenchrus echinatus</i> ) Zacate sabanilla ( <i>Bouteloua repens</i> ).	Iniciar el tratamiento en pre-emergencia del cultivo y maleza
			<b>Hoja ancha</b> Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Quelite bleado ( <i>Amaranthus hybridus</i> )	

\*( ): **Intervalo de Seguridad.** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin límite

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

Cultivo	LMR ATRAZINA (mg/kg)	Fuente	LMR TERBUTRINA (mg/kg)	Fuente
Sorgo	0.20	EPA	0.1	The Japan Food Chemical Research Foundation

\* Environmental Protection Agency

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

**Preparación:** Use su equipo de protección personal. Agite bien el producto antes de usarlo. Destape la botella con precaución. Añada agua al equipo de aplicación (para hacer una pre-mezcla), posteriormente agregue la dosis de producto a utilizar manteniendo una agitación constante, complete la cantidad de agua necesaria (se recomienda utilizar 350 L de agua /ha según el equipo de aplicación y tamaño del cultivo), agite cuidadosamente hasta conseguir una mezcla homogénea.

**Aplicación:** Se obtienen mejores resultados cuando se aplica en pre-emergencia y se incorpora oportunamente, ya que el producto actúa principalmente al ser absorbido por las raíces de las malezas cuando están pequeñas, pero antes de que alcancen una altura de 5 cm. Si los zacates son abundantes, hágase el tratamiento antes de que amacolle. Asegúrese de tener una cobertura total de las malezas para el mejor control. Se recomienda aplicar con una boquilla de abanico previamente calibrada.

### CONTRAINDICACIONES.

Este producto no debe aplicarse sin el equipo de protección personal adecuado. No debe aplicarse en horas de calor intenso (temperatura mayor a 35 °C), ni cuando las abejas se encuentren libando. No aplicarse cuando haya vientos fuertes, superiores a 10 km/h.

**FITOTOXICIDAD.**

Este producto no es fitotóxico en los cultivos, dosis y la forma de aplicación recomendados en esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD.**

Este producto no debe mezclarse con otros productos. Antes de realizar la aplicación de una mezcla de productos, deberá efectuarse una prueba previa para verificar la compatibilidad de las sustancias y sólo podrán mezclarse productos que cuenten con el registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)