



FITOTERRA® 20

Insecticida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado: **RSCO-INAC-0120-053-009-020**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO DIAZINON: 0,0 dietil-0-[6-metil-2-(1-metil etil)-4-pirimidinil] fosforotioato. (Equivalente a 200 g de i. a./L a 20°C)	20.00
INGREDIENTES INERTES Diluyente, emulsificante y compuestos relacionados	80.00
TOTAL	100.00



**TÓXICO EN CASO DE INGESTIÓN
TÓXICO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **3 PELIGRO. BANDA AMARILLA**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

FITOTERRA® 20 es un insecticida organofosforado concentrado emulsionable que actúa por contacto e ingestión y se utiliza para combatir y controlar las plagas del suelo en los cultivos que se indican abajo.

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS Y OBSERVACIONES
Maíz Frijol	Gallina Ciega	<i>Phyllophaga</i> spp <i>Anomala</i> spp <i>Cyclocephala</i> spp	Se recomienda 4 a 5 L/ha de FITOTERRA 20 para aplicación en banda; y 8 a 10 L/ha para aplicación total.
	Gusanos trozadores	<i>Agrotis</i> spp <i>Peridroma</i> spp <i>Prodenia</i> spp <i>Feltia</i> spp <i>Euxoa</i> spp	Diluir el producto en la cantidad de agua que sea suficiente para cubrir la superficie a tratar, según si es banda o aplicación total.
	Gusanos de alambre	<i>Melanotus</i> spp <i>Drasterius elegans</i>	Para aplicaciones en banda

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



		<i>Agriotes spp</i>	asperje la solución directamente al suelo (a la base de la planta), incorporando el producto a una profundidad de 10 cm.
	Hormigas arrieras	<i>Atta mexicana</i> <i>Atta cephalotes</i> <i>Atta texana</i>	
	Grillos de campo	<i>Gryllus assimilis</i>	
	Diabroticas o Gusano alfilerillo	<i>Dibrotica spp</i>	

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Frijol	0.50	EPA*
Maíz	0.01	EPA

*Environmental Protection Agency

MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: La dosis indicada se diluye en 200 a 400 litros de agua por hectárea. La mezcla debe asperjarse directamente al suelo, ya sea aplicación en banda o aplicación total. Cuando el cultivo ya está establecido, se aplica a la base de la planta. La aplicación se hace con equipo terrestre.

CONTRAINDICACIONES: No se debe aplicar en horas de calor intenso (>35°C) ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD: FITOTERRA® 20 no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx