

FULRAT®

Rodenticida

Bloque parafinado

Producto registrado: **RSCO-URB-RODE-501-304-033-0.005**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: BRODIFACOUM: 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftalenil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona (Equivalente a 0.05 g de i.a./kg).	0.005
INGREDIENTES INERTES: Atrayentes, aditivos y colorantes	99.995
TOTAL	100.000



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECACUCION, BANDA AZUL

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO

FULRAT® (brodifacoum) es un rodenticida anticoagulante de “segunda generación” formulado como minibloques parafinados de 3.5 g cada uno. Es de dosis única. Puede utilizarse en interiores y exteriores de casas, edificios, almacenes, restaurantes, hoteles, mercados, tiendas de autoservicio, industria alimentaria y medios de transporte.

PLAGA	DOSIS		DOSIS kg/ha
	INFESTACIÓN ALTA	INFESTACIÓN BAJA O DOSIS MANTENIMIENTO	
Rata (<i>Rattus norvegicus</i>) Rata de piso (<i>Rattus rattus</i>) Ratón (<i>Mus musculus</i>)	Colocar 16 minibloques cada 3 a 5 metros	Colocar 8 minibloques cada 5 a 10 metros	Repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Sin restricción.**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.**

Abra el envase usando guantes. **FULRAT®** no causa recelo al cebo, por lo que no es necesario el pre-cebado en el área a tratar. Determine la ubicación de nidos, rutas de acceso, rutas de traslado y lugares de alimentación de los roedores. Limpiar el área infestada lo mejor posible. Retirar todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario. El número de bloques parafinados a usar dependerá de la severidad de la infestación.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Revisar semanalmente los cebaderos y rellenarlos cuando sea necesario. Reemplazar completamente todo cebo que se haya contaminado o dañado (moho). Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo. Mantenga algunos cebaderos permanentes para evitar reinfestaciones.

Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.

CONTRAINDICACIONES. No exponga el producto a niños y animales domésticos. Aplique el producto en lugares fuera del alcance de los niños, mascotas u otros animales domésticos de modo que se impida el acceso o la remoción del rodenticida por ellos. No coloque este producto en lugares donde exista la posibilidad de estar en contacto con productos alimenticios. Los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimentos y de las fuentes de agua.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx