



GRANBIOL®

Insecticida agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: **RSCO-INAC-0119-392-009-003**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
DELTAMETRINA: (S)- α -ciano-3-fenoxibencil(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 25 g de i. a./L a 20 °C)	2.69
INGREDIENTES INERTES Butóxido de piperonilo (sinergista), solvente, emulsificantes, antioxidante regulador de pH, impurezas y compuestos relacionados.	97.31
TOTAL	100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Granbiol® es un insecticida piretroide que actúa por ingestión y contacto. Se recomienda para el control del picudo *Sitophilus zeamais* en grano de maíz almacenado.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	APLICACIÓN**
Maíz	Picudo (<i>Sitophilus zeamais</i>)	20 mlton de grano de maíz	1	Mezclar el producto previamente en 2 a 4 litros de agua. Aplicar con aspersora de mochila, uniformemente sobre el grano de maíz al momento de almacenarlo en la bodega.

*(): **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y el consumo del grano de maíz.

****Observaciones:** Aplicación a grano de maíz almacenado

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: Se puede ingresar a los sitios tratados media hora después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Maíz	10	EPA*

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Se recomienda diluir **Granbiol®** en 3 L de agua, para una tonelada de grano, y distribuir la mezcla al momento de descargar. Se puede utilizar una aspersora manual o motorizada, previamente calibrada, y cerrar perfectamente la tapa del tanque. Se recomienda el uso de boquillas de cono hueco, con lo cual se obtienen gotas muy finas. Evite derrames.

CONTRAINDICACIONES.

El contenido de humedad del grano a tratar debe ser menor a 15%.

FITOTOXICIDAD.

Granbiol® no afecta el poder germinativo del grano de maíz a la dosis indicada.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx