



## META® 600

Insecticida agrícola

Líquido soluble

Producto registrado: **RSCO-INAC-0144-315-052-048**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	48.20
<b>METAMIDOFOS (USO RESTRINGIDO):</b> O,S-Dimetil fosforoamidotoato (Equivalente a 600 g de i. a./L a 20 °C)	
<b>INGREDIENTES INERTES</b>	
Diluyente y compuestos relacionados.	51.80
<b>TOTAL</b>	100.00



**MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN  
MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
MORTAL SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **2 PELIGRO. BANDA ROJA**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**META® 600** es un insecticida organofosforado sistémico, que actúa por contacto e ingestión; formulado como líquido soluble. Se recomienda para las siguientes plagas:

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Algodonero *(50)	Gusanos trozadores Gusanos defoliadores Medidor del algodouero Chinche rápida y Ligus Pulga saltoua y negra Mosquita blanca Trips Araña roja Conchuela Pulgón	<i>Agrotis ípsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Estigmene acraea</i> <i>Alabama argillacea</i> <i>Creontiades debilis</i> , <i>C. rubrinervis</i> ; <i>Lygus lineolaris</i> <i>Psallus seriatus</i> , <i>Spanagonichus</i> <i>albofasciatus</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Frankliniella</i> spp. <i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Chlorochoroa ligata</i>	1.0 – 1.5

#### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



		<i>Aphis gossypii</i>	
Brócoli *(14) Col *(35) Col de Bruselas *(14) Coliflor *(28)	Gusanos trozadores Gusano falso medidor Gusano del corazón de la col Palomilla dorso de diamante Chinche arlequín Pulgas saltonas Maripositas blancas Pulgón	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Copitarsia consueta</i> <i>Plutella xylostella</i> <i>Murgantia histrionica</i> <i>Phyllotreta</i> spp., <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Leptophobia aripa</i> , <i>Pieris rapae</i> <i>Myzus persicae</i>	1.0 – 1.5
Pepino *(7) Melón *(7)	Gusanos trozadores Gusanos del furto Gusano falso medidor Barrenador de guías Minador de la hoja Pulgón Araña roja Mosquitas blancas Trips Doradilla	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Heliothis virescens</i> , <i>H. zea</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Papaipena nebris</i> <i>Liriomyza pusilla</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Oligonychus mexicanus</i> <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Trips tabaci</i> , <i>Aeolothrips major</i> <i>Diabrotica balteata</i>	1.0 – 1.5
Berenjena *(14) Chile *(14) Jitomate *(7)	Gusanos trozadores Gusano falso medidor Gusano soldado Gusanos del fruto Gusano del cuerno Araña roja Mosquita blanca Chinche pequeña del tomate Trips Minador de la hoja Doradilla	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Heliothis virescens</i> , <i>H. zea</i> <i>Manduca quinquemaculata</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Dicyphus minimus</i> <i>Trips tabaci</i> , <i>Aeolothrips major</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> <i>Liriomyza</i> sp. <i>Diabrotica balteata</i>	1.0 – 1.5
Lechuga *(14)	Gusanos trozadores Gusano falso medidor Gusano soldado Pulgón	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Myzus persicae</i>	1.0 – 1.5
Papa *(14)	Gusanos trozadores Gusano falso medidor Gusano soldado Pulgones Mosquita blanca Chinche apestosa Catarinita de la papa	<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A. malefida</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Murgantia histrionica</i> <i>Leptinotarsa undecemlineata</i>	1.0 – 1.5 1.0 – 1.5
Tabaco *(S/L)	Gusano trozador de la yema Gusano del cuerno Gusanos defoliadores Mosquita blanca Chinche Pulgón Pulga saltona	<i>Heliothis virescens</i> <i>Manduca sexta</i> <i>Trichoplusia ni</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Estigmene acraea</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Lygus lineolaris</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Phyllotreta</i> spp	1.0 – 1.5

\* Intervalo de seguridad (días)

S/L = Sin límite

**TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 24 horas después de la aplicación.**

#### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

www.dragon.com.mx



## LMR (Límite Máximo de Residuos):

Cultivo	LMR (mg/Kg)	Fuente
Algodonero	0.1 mg/Kg	Environmental Protection Agency
Brócoli	1.0 mg/Kg	
Col	1.0 mg/Kg	
Col de Bruselas	0.01 mg/Kg	
Coliflor	0.01 mg/Kg	
Pepino	0.01 mg/Kg	
Melón	0.01 mg/Kg	
Berenjena	0.01 mg/Kg	
Chile	0.01 mg/Kg	
Jitomate	0.01 mg/Kg	
Lechuga	0.01 mg/Kg	
Papa	0.1 mg/Kg	

## MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

La dosis depende del estado vegetativo de los cultivos y del grado de infestación de las plagas. Con aspersora manual se recomienda alrededor de 400 L de agua/ha; con tractor de 200 a 300 L.

**CONTRAINDICACIONES.** No aplique el producto a temperaturas altas (> 35°C) ni cuando el viento sea muy fuerte (> 15 km. /hr.).

**FITOTOXICIDAD.** Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

## INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **META® 600** en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**MANEJO DE RESISTENCIA:** "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

### Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

### Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

### Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

# DRAGON®

www.dragon.com.mx