



TAPPS'O®

Molusquicida agrícola.

Pellets

Producto registrado: RSCO-MOLU-0801-301-057-006

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL | % EN PESO |
|--|-----------|
| INGREDIENTE ACTIVO: METALDEHIDO: 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7 tetraoxaciclo-octano (equivalente a 60 g de i.a/kg). | 6.00 |
| INGREDIENTES INERTES: Atrayentes y aditivos | 94.00 |
| TOTAL | 100.00 |



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

TAPPS'O® es un molusquicida formulado como cebo peletizado, que actúa por ingestión. Se utiliza tal como viene. Este producto atrae a las babosas y caracoles perjudiciales. Al ser ingerido elimina a estas plagas con una sola dosis.

TAPPS'O® se recomienda contra las plagas y cultivos que a continuación se indican:

| CULTIVO | DOSIS kg/ha | PLAGA | DOSIS Y OBSERVACIONES |
|---|-------------|---|---|
| Frutales Caducifolios y Perennes | 7 - 15 kg | Babosas <i>Vaginulus plebeius</i> <i>Arion hortensis</i> <i>Deroceras agreste</i> | Aplicación general: Usando una sembradora mecánica, o una distribuidora de fertilizante, o bien manualmente al voleo. Es sumamente importante asegurar una distribución del producto en el terreno lo más uniforme posible. Para aplicaciones en pequeña escala esparcir los pellets a una distancia aproximada de 7.5 a 10 cm entre cada uno de éstos, o bien en |

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Hortalizas | | Caracolillo <i>Zonitoides arboreus</i> | pequeños montoncitos a una distancia de aproximadamente 60 cm entre cada uno. Momento oportuno de aplicación: Aplique TAPPS'O® cuando el ambiente esté húmedo, ya que en estas condiciones las babosas y caracoles manifiestan mayor actividad. Las aplicaciones hágalas preferentemente por la tarde. No aplique si existe pronóstico de lluvia, y no aplique riegos por al menos 2 días después del tratamiento. Si el ataque es severo después de la emergencia del cultivo, la aplicación debe ser repetida tantas veces como sea necesario. |
| Cultivos básicos | | | |
| Ornamentales | | | |

Intervalo de seguridad: Tiempo entre la última aplicación y la cosecha: 10 Días

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación del producto.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

| CULTIVO | LMR (mg/kg) | FUENTE |
|--|-------------|--------|
| Alcachofas | 0.07 | EPA* |
| Almendra | 0.05 | UE** |
| Berries | 6.25 | EPA |
| Cactus | 0.07 | EPA |
| Maíz forrajero | 0.30 | EPA |
| Maíz grano. | 0.05 | EPA |
| Maíz dulce | 0.30 | EPA |
| Cítricos | 0.26 | EPA |
| Ginseng | 0.05 | EPA |
| Pastos | 2.0 | EPA |
| Lechuga | 1.73 | EPA |
| Leguminosas, | 0.20 | EPA |
| Menta | 12 | EPA |
| Hierbabuena | 4.0 | EPA |
| Berenjena, chile, jitomate | 0.24 | EPA |
| Brócoli, col, col de Bruselas, coliflor, espinaca, nabo, | 2.5 | EPA |
| Frijol ejotero | 1.5 | EPA |
| Berros | 3.2 | EPA |
| Nuez | 0.05 | UE |
| Manzana | 0.05 | UE |

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271





| | | |
|-------------|------|----|
| Pera | 0.05 | UE |
| Membrillo | 0.05 | UE |
| Nispero | 0.05 | UE |
| Albaricoque | 0.05 | UE |
| Cereza | 0.05 | UE |
| Melocoton | 0.05 | UE |
| Ciruella | 0.05 | UE |
| Aguacate | 0.05 | UE |
| Papaya | 0.05 | UE |
| Plátano | 0.05 | UE |
| Mango | 0.05 | UE |
| Piña | 0.05 | UE |
| Guayba | 0.05 | UE |
| Cilantro | 0.1 | UE |
| Apio | 2.0 | UE |

*Environmental Protection Agency **Union Europea

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, tome firmemente la bolsa y corte por uno de los ángulos de la bolsa, usando un material de corte adecuado, evitando tirar ni entrar en contacto directo con el producto.

CONTRAINDICACIONES:

Mantenga a las aves de corral lejos de las áreas tratadas por al menos 7 días.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico a las dosis recomendadas y aplicándolo bajo las recomendaciones que aquí se muestran.

INCOMPATIBILIDAD.

No es necesario mezclarlo con otros productos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx