CARTA TÉCNICA



ELICIT®

Regulador de crecimiento tipo 1

Líquido

Producto registrado: RSCO-116/VI/19

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	% EN PESO
MBS (compuesto de acción hidrosoluble del grupo vitamínico K: 2-metil-1,4-naftoquinona)	4.0
Activadores metabólicos orgánicos (materia orgánica, en forma de: prolina 11.0%; glicina 10.0%; alanina 6.0%; otros activadores metabólicos de origen peptídico 17.0%)	44.0
Nitrógeno orgánico	7.0
Nitrógeno amoniacal	0.7

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO:

ELICIT® es un regulador de crecimiento tipo 1 líquido de aplicación foliar. Se puede aplicar en cultivos a campo abierto o bajo invernadero. Este producto coadyuva al amarre de la flor, mejora la calidad de la fruta, la distribución en tiempo de cosecha y mejora el rendimiento por hectárea.

CULTIVO	DOSIS L/100 L de agua	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Jitomate, pimiento y papa	0.3	Pulverización foliar. 1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. Aplicaciones posteriores: cada 15 días tras la primera aplicación. Total de aplicaciones: hasta 4 aplicaciones
Melón, pepino, sandía, calabacita	0.3	Pulverización foliar 1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. . Aplicaciones posteriores: cada 15 días tras la primera aplicación. Total de aplicaciones: hasta 4 aplicaciones
Col, brócoli, zanahoria, nabo, rábano.	0.3	Pulverización foliar 1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante Aplicaciones posteriores: cada 15 días tras la primera aplicación. Total de aplicaciones: hasta 4 aplicaciones
Lechuga, apio, col.	0.3	Pulverización foliar 1ª. Aplicación: 5-10 días después del transplante. . Aplicaciones posteriores: cada15 días tras la primera aplicación. Total de aplicaciones: hasta 4 aplicaciones

CARTA TÉCNICA



		Pulverización foliar
		1a. Aplicación: 5-10 días después del transplante.
Fresa, frambuesa	.0.3	. Aplicaciones posteriores: cada 15 días tras la primera
		aplicación.
		Total de aplicaciones: hasta 4 aplicaciones

METODOS PARA PREPARA EL PRODUCTO:

Agite bien el envase antes de usar el producto. Calibrar su equipo de aplicación antes de realizar la aspersión. Con el equipo de protección puesto destape el frasco con cuidado; mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad del producto necesario y poca agua, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue el producto, agite perfectamente y, complete con agua hasta su capacidad, agitando continuamente. Aplique inmediatamente.