



## DICTADOR GR®

*Insecticida Agrícola*

*Granulado*

Producto registrado: **RSCO-INAC-0101A-X0543-005-1.0**

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>FIPRONIL:</b> 5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo (Equivalente a 10 g de i.a./kg)	1.00
<b>INGREDIENTES INERTES</b>	
Disolvente, portador, secante, antiapelmazante, humectante, adherente y colorante.	99.00
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO SI SE INHALA**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCIÓN. BANDA AZUL**

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**DICTADOR GR®** es un insecticida formulado como granulado; actúa por contacto e ingestión. Se recomienda en los cultivos y contra la plaga que se indican en el cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS kg/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Papa	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga ravidia</i> )	10-20	0	Realizar una aplicación en el fondo del suro, al momento de la siembra.
Avena Cebada Centeno Maíz Sorgo Trigo	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga ravidia</i> )	12-20	0	Realizar una aplicación en el fondo del surco, al momento de la siembra.

\*Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación.



CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Avena	0.005	COFEPRIS*
Cebada	0.005	
Centeno	0.005	
Maíz	0.02	
Papa	0.03	
Sorgo	0.005	
Trigo	0.005	

\*Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta, o lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el saco del producto jalando los dos hilos de la costura, o usando un cuchillo si el cierre del saco es por sellado. Abrir, vaciar y pesar en una balanza (cuando proceda) en un área bien ventilada, y en su caso, a favor del viento. Vacíe el producto en la tolva o depósito del equipo de aplicación, si es el caso. Realice estas operaciones con mucho cuidado a fin de evitar derrames, salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. El producto ya viene listo para usarse. La aplicación se hace en el fondo del surco de manera manual o con equipo montado al tractor o equipo manual, al momento de la siembra.

### CONTRAINDICACIONES.

No aplique este producto sin el equipo de protección adecuado. No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr) ni a temperaturas muy altas (>35 °C).

### FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

### INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.