



DRAGOFLEX®

Herbicida Agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: RSCO-HEDE-0263-X0175-009-21.70

COMPOSICION PORCENTUAL	% EN PESO
FOMESAFEN: 5-(2-cloro- α,α,α -trifluoro -p-toliloxi)-N- mesil-2-nitrobenzamida (Equivalente a 250 g i.a./L a 20 °C)	21.70
INGREDIENTES INERTES Emulsificantes y disolventes	78.30
TOTAL	100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 PRECAUCION. BANDA AZUL

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DRAGOFLEX® es un herbicida de contacto, selectivo a los cultivos de soya y frijol para el control post-emergente de la maleza indicada en la etiqueta. Se aplica en post-emergencia de los cultivos de soya y frijol.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha.	INTERVALO DE SEGURIDAD*
Frijol**	Achual (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Gigantón (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Quesitos (<i>Malva parviflora</i>)	1.0 a 1.5	SL
	Golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	0.75 a 1.0	
Soya	Aceitilla (<i>Bidens pilosa</i>) Huachapore (<i>Xanthium</i> spp.) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Gloria de la mañana (<i>Ipomoea</i> sp.) Lechosa, golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>)	0.75 a 1.0	SL

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha.	INTERVALO DE SEGURIDAD*
	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Malvasisco, quesillo (<i>Anoda cristata</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Toloache (<i>Datura spp.</i>) Tomatillo (<i>Physalis spp.</i>)		

*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite.

**Observaciones: Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y cultivo; volumen de aplicación 450 L de agua/ha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

Cultivo	LMR (mg/kg)	Fuente
Frijol	0.05	EPA*
Soya	0.05	

* Environmental Protection Agency

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto: (mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta, lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES.

DRAGOFLEX® es selectivo solo a los cultivos de soya y frijol. El frijol criollo yurimuni (*Vigna unculata*) es susceptible a este herbicida, por lo que deberá evitar su uso en esta especie. No se debe aplicar en horas de calor intenso (>30 °C) ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr. Puede ocurrir una reducción en el control de las malezas si la aplicación de este producto se realiza con suelo seco o cuando las malezas están bajo estrés y sin crecimiento activo. No debe aplicarse sobre malezas cubiertas con tierra.

La persistencia del producto dependerá del tipo de suelo, condiciones de humedad o riego y radiación solar. Respetar un intervalo de 7 días entre la aplicación de **DRAGOFLEX®** y la de otro herbicida.

No aplicar en etapa de floración.

En la rotación de cultivos, para sembrar arroz, trigo y cebada se debe esperar 12 semanas después de la última aplicación de este producto. Para otros cultivos, deje pasar 6 semanas. Para el caso de maíz y sorgo sembrar después de un año de haber aplicado **DRAGOFLEX®**. No sembrar cereales de invierno hasta 4 meses después de una aplicación de este producto. No sembrar otros cultivos hasta 7 meses después de la aplicación de **DRAGOFLEX®**. En suelos ligeros con bajo contenido de materia orgánica no sembrar sorgo durante 12 meses.

FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

**INCOMPATIBILIDAD.**

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”.: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx