

ESTOICO®*Herbicida agrícola**Suspensión Acuosa*Producto registrado: **RSCO-MEZC-HEDE-1240-X0054-008-59.0**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDEINTE ACTIVO:	
ATRAZINA: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazin-2,4-diamina (Equivalente a 370 g de i.a. / L a 20°C)	33.08
S-METOLACLOR: mezcla de 80-100%: (aRS, 1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-toluidida y 20 – 0% (aRS, 1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-toluidida. (Equivalente a 290 g de i.a. / L a 20°C)	25.93
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, preservante, modificador reológico, dispersante, antiespumante y anticongelante.	40.99
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.****ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO.**

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

ESTOICO® es una mezcla de dos ingredientes activos: atrazina y s-metolaclor, que combinados, ejercen acción contra las malezas que se indican en el siguiente cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DIAS)*	OBSERVACIONES
Agave	Campanilla (<i>Ipomoea purpurea</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Lentejilla (<i>Lepidium virginicum</i>)	2.0 – 6.0	No aplique en plantaciones mayores a 5 años.	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergencia al cultivo; volumen de aplicación sugerido 700-800 L de agua/ha.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DIAS)*	OBSERVACIONES
Maíz	Flor amarilla (<i>Baltimora recta</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>) Acahualillo (<i>Bidens pilosa</i>) Botón de oro (<i>Melampodium divaricatum</i>) Nabo del campo (<i>Brassica campestris</i>)	4.0 – 6.0	0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación sugerido 450-550 L de agua/ha.

*(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR Atrazina (mg/kg)	LMR S-metolaclor (mg/kg)	FUENTE
Agave	Exento	Exento	COFEPRIS*
Maíz	0.25	0.1	

*Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agite el envase del producto antes de abrirlo, Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; careta o gafas de seguridad, o lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante.

Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

En el caso de maíz aplique este producto enseguida de la siembra, antes de que germine la maleza y de preferencia sobre suelo húmedo.

CONTRAINDICACIONES.

No se aplique donde haya cultivos asociados susceptibles, como frijol y hortalizas. En agave no aplique en plantaciones mayores de 5 años. No aplicar con vientos arriba de 8 km/hr.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con otros productos agroquímicos. Si se desea mezclar **ESTOICO®**, la mezcla se hará con productos registrados y en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".