



DICTADOR

Insecticida Agrícola

Suspensión Concentrada

Producto registrado: **RSCO-INAC-0101A-X0442-064-17.88**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifloro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo (Equivalente a 200 g de i.a./L)	17.88
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes, dispersantes, anticongelante, humectante, preservante, antiespumante, modificador reológico.	82.12
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:4, **PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

**INSTRUCCIONES DE USO
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

DICTADOR es un insecticida formulado como suspensión acuosa (floable) que actúa por contacto e ingestión. Se recomienda en el cultivo y contra la plaga que se indica en el cuadro.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Algodón	Picudo del algodónero (<i>Anthonomus grandis</i>)	200 – 300 ml/ha	45	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga; volumen de aplicación 350 – 450 L de agua/ha.
Crisantemo	Trips (<i>Thrips</i> sp.)	75 - 200 ml/ha	Sin Límite	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, volumen de aplicación 150 – 250 L de agua/ha.
Maíz	Gallina ciega (<i>Philophaga ravida</i>)	0.6 – 1.0	Sin Límite	Realizar una aplicación al momento de la siembra al fondo del surco cubriendo la semilla, volumen de aplicación 150 – 250 L de agua/ha.
Papa	Gallina ciega (<i>Philophaga ravida</i>)	0.5 – 1.0	45	Realizar una aplicación al fondo del surco al momento de la siembra; volumen de aplicación 170 – 270 L de agua/ha.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Agave	Picudo del agave (<i>Scyphophorus acupunctatus</i>)	1.3-2.0 mL/L de agua	Sin Límite	Realizar dos aplicaciones en drench a la base de la planta a intervalos de 7 días, Iniciar cuando se detecten los primeros adultos activos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 120 mL de mezcla/planta (350-450 L/ha).
Caña de Azúcar	Complejo de Barrenadores (<i>Diatraea saccharalis</i> y <i>Diatraea magnifactella</i>)	0.6-1.0	30	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 14 días. Iniciar cuando se encuentren los primeros tallos perforados y/o las primeras larvas. Periodo de protección de 56 días o hasta 70 días con la dosis más alta. Volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.

****Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR:

Cultivo	LMR Fipronil (ppm)	Fuente
Algodón	Exento	COFEPRIS
Crisantemo	Exento	
Maíz	0.02	
Papa	0.03	
Agave	Exento	
Caña de azúcar	0.005	

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón o sombrero, respirador o mascarilla, lentes de seguridad para productos químicos, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES. No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

www.dragon.com.mx