



METRAXX

Herbicida agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: **RSCO-HEDE-0237-X0211-009-86.9**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
S-METOLACLOR: Mezcla de (aRS,1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)acet-o-toluidida y (aRS,1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)-acet-o-toluidida (Equivalente a 960 g de i.a./L a 20°C)	86.90
INGREDIENTES INERTES: Emulsificantes y solvente.	13.10
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO.

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

METRAXX Es un herbicida selectivo de presembrado para el control de maleza de hoja angosta y algunas de hoja ancha. Se recomienda su uso para el control de las siguientes especies de maleza y el cultivo indicado:

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/ ha)	OBSERVACIONES
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz (Sin límite) *	Cadillo Pata de gallina Pasto inglés Zacate gigante Quintonil Aceitillo Verdolaga	<i>Cenchrus pauciflorus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Portulaca oleracea</i>	1.0 – 1.3	Realizar una aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y post-emergencia al cultivo; volumen de aplicación 180 – 280 L de agua/ha.

*() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL): Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la última aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Maíz	0.01	COFEPRIS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección declarado en el apartado **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**, para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia, agregue la dosis a emplear de **METRAXX** e inicie la agitación. Complete con agua la capacidad del tanque y continúe con la agitación. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice 420 litros de agua por hectárea.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar con vientos mayores de 10 km/h, ni cuando esté próximo a llover.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

Este producto es compatible para realizar mezclas a la dosis recomendada con el producto Atrazine 76% + Mesotrione 12% WG.

“MANEJO DE RESISTENCIA”. "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".