



DRASP

Fungicida agrícola

Suspensión Concentrada

Producto registrado: **RSCO-MEZC-FUNG-0309-0301D-X0106-064-47.8**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO	
CLOROTALONIL: Tetracloroisofaltonitrilo (Equivalente a 500 g de i.a./L).	39.83
DIMETOMORF: (EZ)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4 dimetoxifenil)acriloil]morfolina (Equivalente a 100 g de i.a./L).	7.97
INGREDIENTES INERTES	
Dispersantes, agente Humectante, espesante, anticongelante, Modificador de estructura, antiespumante, conservador y solvente	52.2
TOTAL:	100.00

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5 PRECAUCIÓN, BANDA VERDE**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS
INSTRUCCIONES DE USO:
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

DRASP es un fungicida formulado como suspensión concentrada utilizado para el control de las plagas mencionadas en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Calabacita Calabaza Melón Pepino	Mildiú <i>Pseudoperonospora cubensis</i>	1.50 – 2.00 L/ha	Sin Límite	Realizar dos aplicaciones foliares de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 600L de agua /ha.
Berenjena Chile Jitomate	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	1.50 – 2.00 L/ha	7 días	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON[®]

www.dragon.com.mx



Papa Pimiento morrón Tomate verde				primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L/ha.
Cebolla	Mildiú <i>Pseudoperonospora destructor</i>	1.50 – 2.00 L/ha	7 días	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L/ha.

*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS.

12 horas

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg) Clorotalonil	LMR (mg/Kg) Dimetomorf	FUENTE
Calabacita	5	0.5	COFEPRIS
Calabaza	5	0.5	
Melón	5	0.5	
Pepino	5	0.5	
Berenjena	6.0	1.5	
Chile	5	1.5	
Jitomate	5	1.5	
Papa	0.1	0.15	
Pimiento morrón	6.0	1.5	
Tomate verde	5	1.5	
Cebolla	0.5	0.6	

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

"Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria **DRASP** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

www.dragon.com.mx



FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersion caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD.

No se recomienda **DRASP** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “**PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.**

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx