



BALYA®

Fungicida agrícola

Suspensión Concentrada

Producto registrado: **RSCO-FUNG-0579-X0500-064-22.8**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO

PICOXISTROBIN: metil (E)-3-metoxi-2-{2-[6-(trifluorometil)-2-piridiloximetil]fenil}acrilato
Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C).

22.80

INGREDIENTES INERTES

Agentes dispersantes, espesantes, conservador, anticongelante, antiespumante y disolvente.

77.20

TOTAL:

100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

BALYA® es un fungicida que se utiliza para el control de las plagas y cultivos que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Avena Cebada Centeno Maíz Sorgo Trigo Triticale	Roya (<i>puccinia graminis</i>)	0.5 – 1.0	14	Realizar dos aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días al detectar los primeros síntomas de la enfermedad y la incidencia y severidad sea menor al 5%; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua/ha.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Berenjena Chile Jitomate Okra Pimiento morrón Tomate de cáscara Papa	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.4 – 0.6	3	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 600 L agua/ha.

*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: Sin límite.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg)	FUENTE
Avena	0.04	COFEPRIS
Cebada	0.03	
Centeno	0.04	
Maíz	0.04	
Sorgo	0.04	
Trigo	0.04	
Triticale	0.04	
Berenjena	0.7	
Chile	0.7	
Jitomate	0.7	
Okra	0.7	
Pimiento morrón	0.7	
Tomate de cáscara	0.7	
Papa	0.03	

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" (gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno). Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad incorpore lentamente la cantidad de **BALYA** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase vacío y deposite en un Centro de Acopio Autorizado.

CONTRAINDICACIONES.

No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o esté lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto.



Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD. BALYA no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

No debe mezclar **BALYA** con otros productos plaguicidas.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.