



NATZU

Bactericida / Fungicida agrícola

Concentrado Soluble.

Producto Registrado: **RSCO-FUNG-0301K-X0501-375-4.01**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO: KASUGAMICINA HCl: D-qui-ro-Inositol, 3-O-(2-amino-4-((carboxiiminometil)amino)-2,3,4,6-tetradeoxi- α -D-arabino-hexopiranosil)-monohidroclorhidrato (Equivalente a 41.2 g de i.a./L)	4.01
INGREDIENTES INERTES: Conservador y Diluyente.	95.99
TOTAL	100.00

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5 PRECAUCIÓN, BANDA VERDE

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

NATZU es un antibiótico aminoglucósido formulado como concentrado soluble con acción **bactericida y fungicida**, que actúa mediante la inhibición de la síntesis de proteínas en bacterias y hongos. **NATZU** posee actividad sistémica; es absorbido por hojas y raíces y traslocado rápidamente a todas las partes de la planta previniendo el crecimiento de lesiones. Se recomienda su uso en los cultivos y contra las enfermedades que a continuación se mencionan:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Agave	Pudrición del cogollo (<i>Pectobacterium carotovorum</i>)	500 – 750 mL/ha	0	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 750 - 850 L de agua/ha.
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía	Mancha angular (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i>)	0.75 – 1.00	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo; volumen de la aplicación sugerido 490 – 590 L de agua/ha.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Cebolla Ajo Cebollín	Pudrición blanda (<i>Erwinia carotovora</i>)	0.75 – 1.25	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 8 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales sean favorables para su desarrollo; volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Jitomate (Tomate rojo) Berenjena Chile Pimiento Tomate verde	Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vesicatoria</i>)	0.75 – 1.00	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días al detectar los primeros síntomas, y cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 550 - 650 L de agua/ha.
Manzano Peral	Tizón del fuego (<i>Erwinia amylovora</i>)	75 – 150 mL / 100 L de agua	68	Realizar 1 aplicación foliar al inicio de la floración y cuando cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 750 – 850 L de agua/ha.
Papa	Pudrición blanda (<i>Pectobacterium carotovorum</i>)	500 – 650	1	Realizar 3 aplicaciones, la primera en banda al momento de la siembra, cubriendo homogéneamente la semilla y la superficie circundante; la segunda y tercera de manera foliar a los 63 y 70 días después de la primera aplicación, respectivamente; volumen de aplicación sugerido 550 - 650 L de agua/ha.

*(0): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección adecuado y completo, descrito en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, abra el envase desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES. No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas bajo las anteriores instrucciones de uso.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

www.dragon.com.mx