



PRESAGE®

Insecticida agrícola

Gránulos dispersables en agua

Producto registrado: **RSCO-INAC-0104A-X0583-420-35.0**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Clorantropilprol: 3-bromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2'-metil-6'-(metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida. (Equivalente a 350 g de i.a./kg)	35.00
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersantes, Agente humectante y Vehículos.	65.00
TOTAL	100.00

**PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDEN SER NOCIVOS POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PRESAGE® es un insecticida de amplio espectro que se recomienda para el control de las siguientes plagas en los cultivos aquí indicados:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/ha)	OBSERVACIONES
Maíz (14)* Sorgo (14)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	40 – 60	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450 L de agua/ha.
Brócoli (3) Col (3) Col de bruselas (3) Colza (3) Mostaza (3)	Palomilla Dorso de Diamante (<i>Plutella xylostella</i>) Falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	60 – 120	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 15 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 450-550L de agua/ha.
Calabacita (1) Calabaza (1) Chayote (1) Melón (1) Pepino (1) Sandía (1)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano del fruto (<i>Diaphnia hyalinata</i>)	50 – 70	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 10 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 250-350L de agua/ha.
Berenjena (1) Chile (1) Tomate verde (1) Jitomate (1) Papa (1)	Gusano del fruto (<i>Heliothis subflexa</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza sativae</i>) Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>)	60 – 120	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 10 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 350-450L de agua/ha.

(*) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin Límite

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



LMR (Límite Máximo de Residuos):

Cultivo	LMR (mg/kg)	Fuente
Berenjena	1.4	COFEPRIS
Brócoli	4	
Calabacita	0.5	
Calabaza	0.5	
Chayote	0.5	
Chile	1.4	
Col	4	
Col de bruselas	4	
Colza	2	
Jitomate	1.4	
Maíz	0.04	
Melón	0.5	
Mostaza	2	
Papa	0.3	
Pepino	0.5	
Sandia	0.5	
Sorgo	6	
Tomate de cascara	1.4	

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

"Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **PRESAGE** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación".

CONTRAINDICACIONES. No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

FITOTOXICIDAD. No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las dosis y recomendaciones de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersión caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda **PRESAGE** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

www.dragon.com.mx