



PROBENCE®

Fungicida agrícola

Gránulos dispersables en agua

Producto registrado: **RSCO-MEZC-FUNG-1301A-X0062-420-38.00**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO	
Piraclostrobina: metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi)carbamato..... (Equivalente a 128 g de i.a./kg)	12.80
Boscalid: 2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida..... (Equivalente a 252 g de i.a./kg)	25.20
INGREDIENTES INERTES	
Surfactante, humectante, dispersante, desintegrante y carga.....	62.00
TOTAL:	100.00

**PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5 PRECAUCIÓN BANDA VERDE

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PROBENCE® es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa erradicante, que combina la acción de dos ingrediente activos piraclostrobina y boscalid, ambos principios activos afectan la producción de energía de las células del hongo, afectando sus funciones vitales. Preventivamente actúa inhibiendo la germinación de la espora. La acción curativa y erradicante de piraclostrobina provoca la desintegración de las cadenas de esporas, inhibiendo consistentemente la esporulación, al mismo tiempo dejan de funcionar los sistemas de bombeo de la membrana celular. El lugar de acción, a nivel celular, es la cadena de respiración de la mitocondria. Boscalid inhibe la germinación de esporas. A nivel molecular inhibe la enzima succinato deshidrogenasa la cual es parte importante en el Ciclo de Krebs, afectando de esta manera el flujo de carbonos a los metabolitos como la cadena de ATP.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



CULTIVO	PLAGA	DOSIS g/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Berenjena Chile Jitomate Papa	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>) Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	700 - 800	SL	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten las condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación 550-650 L/ha.

*Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/Kg) Piraclostrobina	LMR (mg/Kg) Boscalid:
Berenjena	1.4	1.2
Chile	0.5	1.2
Jitomate	1.4	1.2
Papa	0.04	0.05

Fuente: COFEPRIS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Siempre use el equipo de protección descrito en la parte izquierda de esta etiqueta, bajo el título "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Con el equipo de seguridad puesto, abra cuidadosamente la bolsa y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla de la dosis a emplear de **PROBENCE** en un recipiente limpio y por separado con agua limpia e inicie la agitación. Complete con agua la capacidad del tanque y continúe con la agitación. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice 550-650 litros de agua por hectárea

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar con vientos mayores de 10 km/h, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

No se debe mezclar **PROBENCE** con otros plaguicidas..

"MANEJO DE RESISTENCIA": "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

www.dragon.com.mx