

**COSMIC®**

Fungicida agrícola

Concentrado Emulsionable

Producto registrado: **RSCO-FUNG-0301O-X0400-009-25.0****“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”****% EN PESO****INGREDIENTE ACTIVO:****PIRACLOSTROBINA:** metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi)carbamato.  
(Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C).

25.00

**INGREDIENTES INERTES:**

Emulsificante, dispersante y solventes

75.00

**TOTAL.**

100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN BANDA AZUL****ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO****ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS****INSTRUCCIONES DE USO:****SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**COSMIC®** es un fungicida químico que actúa por la inhibición de la respiración (Fungicida Qol). Debe aplicarse únicamente sobre los cultivos y las dosis recomendadas:

| CULTIVO(S)                                                          | PLAGA(S)                                                        | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aguacate (SL)                                                       | <b>Antracnosis</b><br>( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> ) | 0.5 – 0.75   | Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 14 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 800 L de agua/ha.                         |
| Lima, Limón, Mandarina, Naranja, Tangerino, Toronja (SL)            | <b>Antracnosis</b><br>( <i>Colletotrichum Spp.</i> )            | 0.5 – 0.75   | Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido (1.75 L de agua / árbol) 700 L de agua/ha. |
| Berenjena, Chile, Jitomate, Pimiento morrón, Tomate verde, Papa (7) | <b>Tizón temprano</b><br>( <i>Alternaria solani</i> )           | 0.4 – 0.6    | Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.                          |

**Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

**Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

**Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)



| CULTIVO(S)                                                | PLAGA(S)                                              | DOSIS (L/ha) | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calabacita, Pepino, Melón, Calabaza, Sandía, Chayote (SL) | <b>Cenicilla</b><br>( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) |              | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, al observar los primeros síntomas de la enfermedad.<br>Volumen de aplicación sugerido 370 L de agua/ha.                                                    |
| Frambuesa, Zarzamora, Grosella, Fresa, Vid (7)            | <b>Cenicilla</b><br>( <i>Sphaerotheca spp.</i> )      | 0.5 – 0.6    | Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y la incidencia y severidad sean menor al 5%.<br>Volumen de aplicación sugerido 900 L de agua/ha. |

**Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha  
**(SL):** Sin límite.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación.

**LMR (Límite Máximo de Residuos):**

| CULTIVO         | LMR (ppm) | FUENTE   |
|-----------------|-----------|----------|
| Aguacate        | 0.6       | COFEPRIS |
| Berenjena       | 1.4       | COFEPRIS |
| Calabacita      | 0.5       | COFEPRIS |
| Calabaza        | 0.5       | COFEPRIS |
| Chayote         | 0.5       | COFEPRIS |
| Chile           | 0.5       | COFEPRIS |
| Frambuesa       | 4         | COFEPRIS |
| Fresa           | 1.2       | COFEPRIS |
| Grosella        | 4         | COFEPRIS |
| Jitomate        | 1.4       | COFEPRIS |
| Lima            | 2         | COFEPRIS |
| Limón           | 2         | COFEPRIS |
| Mandarina       | 2         | COFEPRIS |
| Melón           | 0.5       | COFEPRIS |
| Naranja         | 2         | COFEPRIS |
| Papa            | 0.04      | COFEPRIS |
| Pepino          | 0.7       | COFEPRIS |
| Pimiento morrón | 0.5       | COFEPRIS |
| Sandía          | 0.5       | COFEPRIS |
| Tangerino       | 2         | COFEPRIS |
| Tomate verde    | 1.4       | COFEPRIS |
| Toronja         | 2         | COFEPRIS |
| Vid             | 1         | COFEPRIS |
| Zarzamora       | 4         | COFEPRIS |

## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Durante el uso y manejo de este producto, utilizar el equipo de protección adecuado descrito en la sección de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Abra el envase de **COSMIC®** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello (no use la boca para abrir este envase). Mida con probeta la dosis recomendada y diluya en agua vertiendo la dosis previamente medida. En el equipo de aplicación llenar el tanque de la aspersora hasta  $\frac{3}{4}$  de su capacidad, posteriormente agregue **COSMIC®** en la dosis recomendada y termine de llenar con agua mezclando perfectamente el contenido. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la



mezcla y mantenga en constante agitación. Aplíquese con equipo terrestre, por aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

#### **CONTRAINDICACIONES.**

**COSMIC®** no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o esté lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

#### **FITOTOXICIDAD.**

**COSMIC®** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

#### **INCOMPATIBILIDAD.**

No debe mezclar **COSMIC®** con otros productos agrícolas.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

#### **Corporativo San Jerónimo**

Periférico Sur No. 3325, Piso 3, San Jerónimo Lídice.  
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.  
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

#### **Planta Lerma**

Carretera México - Toluca km 52.5,  
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.  
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

#### **Planta Puebla**

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N  
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.  
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

**DRAGON®**[www.dragon.com.mx](http://www.dragon.com.mx)