



LEÑADOR®

Herbicida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado: **RSCO-MEZC-HEDE-0266-0258-X0085-009-47.14**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
FLUROXIPIR-MEPTIL: (RS)-1-metilheptil 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridiloxiacetato (Equivalente a 25 g de i. a./L a 20°C)	2.34
TRICLOPIR BUTOTIL: 2-butoxietil 3,5,6-tricloro-2-piridiloxiacetato. (Equivalente a 480 g de i.a./L a 20 °C).	44.80
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente, solvente, tensioactivos, surfactante y antioxidante	52.86
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS.

INSTRUCCIONES DE USO.

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

LEÑADOR® es un herbicida formulado como concentrado emulsionable, recomendado para el control postemergente de las malezas que aparecen a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/100 L de agua)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*	OBSERVACIONES
Pastizales establecidos en potreros	Gatuño (<i>Mimosa biuncifera</i>) Soliman (<i>Croton ciliato- glandulosus</i>) Gavia (<i>Acacia rigidula</i>) Cojón de gato (<i>Tabernaemontana alba</i>) Cruceto (<i>Randia aculeata</i>)	1.0 – 2.0	0	Realizar una aplicación en postemergencia, por cobertura total dirigida a la maleza, aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo. Volumen de aplicación sugerido 50 – 150 L de agua/ha.
	Zarza de la playa (<i>Mimosa pigra</i>) Cornezuelo (<i>Acacia cornigera</i>)			

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

	Espino blanco (<i>Adelia barvinervis</i>) Uvero (<i>Coccoloba uvifera</i>)			
	Pushual (<i>Croton cortesianus</i>) Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Múchite o guamúchil (<i>Pithecellobium lanceolatum</i>) Huizache (<i>Acacia farnesiana</i>) Escobilla o Malva de escoba (<i>Sida rhombifolia</i>)			

* **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	Fluroxipir-meptil LMR (mg/Kg)	Triclopir Butotil LMR (mg/Kg)	FUENTE
Pastizales establecidos en potreros	120	700	COFEPRIS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección adecuado y completo, descrito en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, abra el envase desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES.

No se debe aplicar en horas de calor intenso ni cuando la velocidad del viento sea mayor de 15 km/hr.

FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con otros productos, aplíquese sólo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.