

**ARDEO®***Herbicida agrícola**Solución acuosa*Producto registrado: **RSCO-HEDE-0231-X0845-013-13.50**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDEINTE ACTIVO:	
GLUFOSINATO DE AMONIO: Ácido (2RS)-2-amino-4-(metilfosfinato)butírico de amonio. (Equivalente a 150 g de ingrediente activo / L a 20°C)	13.50
INGREDIENTES INERTES:	
Agente quelante, Adyuvantes, Antiespumante, Colorante, Humectante y Diluyente.	86.50
TOTAL	100.00

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.****ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO****ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS****INSTRUCCIONES DE USO.****SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.**

ARDEO® herbicida no selectivo que actúa por contacto; no tiene acción en el suelo y no es residual.
De uso agrícola para el control de las malezas de los cultivos que abajo se indican:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Arroz (SL) Avena (SL) Cebada (SL) Maíz (SL) Sorgo (SL) Trigo (SL) Triticale (SL)	Zacate rayado (<i>Echinochloa colona</i>) Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza; volumen de aspersión 230 – 330 L de agua/ha.
Arroz (SL) Avena (SL) Cebada (SL) Maíz (SL) Sorgo (SL) Trigo (SL)	Zacate cadillo (<i>Cenchrus echinatus</i>)		
Agave (0)	Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>) Botón de oro (<i>Melampodium divaricatum</i>) Palocote (<i>Tithonia tubaeformis</i>) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua / ha.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx

	Zacate de agua (<i>Brachiaria plantaginea</i>)		
Aguacate (0)	Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>) Arroz silvestre o pata de gallo (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hierba del sapo o golondrina (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Acahual (<i>Aldama dentata</i>) Acederilla (<i>Oxalis latifolia</i>) Hierba aguada (<i>Melampodium divaricatum</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
Banano (0)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Golondrina (<i>Euphorbia hirta</i>) Falsa altamisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>) Zacate pino (<i>Echinochloa colona</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando tenga una altura menor a 15 cm; volumen de aplicación sugerido: 300 – 400 L de agua/ha.
Café (0)	Botón de oro (<i>Melampodium divaricatum</i>) Aceitillo (<i>Bidens pilosa</i>) Coralillo (<i>Rivina humilis</i>) Hierba del gusano (<i>Acalypha arvensis</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.
Caña de azúcar (0)	Chayotillo (<i>Sicyos deppei</i>) Hierba de sapo (<i>Euphorbia hirta</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Zacate guinea (<i>Megathyrus maximus</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
Cidro (0) Lima (0) Limón (0) Mandarina (0) Naranja (0) Pomelo (0) Tangerino (0) Toronja (0)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Falsa artemisa (<i>Parthenium hysterophorus</i>) Pega Pega (<i>Priva lappulacea</i>) Escobilla (<i>Sida rhombifolia</i>) Zacate bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 250 – 350 L de agua/ha.
Mango (0)	Pega Pega (<i>Priva lappulacea</i>) Farolito (<i>Cardiospermum halicacabum</i>) Hierba del cáncer (<i>Acalypha mexicana</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza, dirigida a ésta cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
	Siempre viva (<i>Commelina diffusa</i>) Coquillo (<i>Cyperus rotundus</i>)	1.5 – 2.0	
Nogal (0) Nogal de castilla (0) Nogal pecanero (0)	Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>) Cebadilla o avena loca (<i>Bromus carinatus</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Acahual, acahual amarillo (<i>Simsia amplexicaulis</i>) Lechuguilla (<i>Sonchus oleraceus</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post-emergencia dirigida a la maleza cuando ésta tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
Almendro (0)	Zacate pinto (<i>Echinochloa colona</i>) Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>)		
Avellano (0)	Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i>)		



Nuez de macadamia (0)	Malva (<i>Malva parviflora</i>)		
Papayo (0)	Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>) Morchete (<i>Cucurbita argyrosperma</i>) Acahual (<i>Tithonia tubaeformis</i>) Trébol (<i>Oxalis latifolia</i>)	1.0 – 2.0	Realizar una aplicación en post emergencia al cultivo y a la maleza, dirigida a ésta cuando tenga una altura menor a 15 cm. Volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua / ha.
	Zacate de agua (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	1.5 – 2.0	

*(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha, y SL = Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 6 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Agave	EXENTO	COFEPRIS
Aguacate	0.3	COFEPRIS
Almendro	0.5	COFEPRIS
Arroz	1	COFEPRIS
Avellana	0.5	COFEPRIS
Avena	1	COFEPRIS
Banano	0.3	COFEPRIS
Café	0.1	COFEPRIS
Caña de azúcar	0.03	COFEPRIS
Cebada	1	COFEPRIS
Cidro	0.15	COFEPRIS
Lima	0.1	COFEPRIS
Limón	0.15	COFEPRIS
Maíz	0.2	COFEPRIS
Mandarina	0.15	COFEPRIS
Mango	0.3	COFEPRIS
Naranja	0.15	COFEPRIS
Nogal	0.1	COFEPRIS
Nogal de castilla	0.1	COFEPRIS
Nogal pecanero	0.1	COFEPRIS
Nuez de macadamia	0.5	COFEPRIS
Papayo	0.3	COFEPRIS
Pomelo	0.15	COFEPRIS
Sorgo	0.4	COFEPRIS



CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Tangerino	0.1	COFEPRIS
Toronja	0.1	COFEPRIS
Trigo	1	COFEPRIS
Triticale	1	COFEPRIS

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el equipo de protección puesto: gorra impermeable, mascarilla contra polvos y gases, lentes de seguridad transparentes con protección hermética o careta protectora, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, guantes y botas de neopreno, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES.

No aplicar el producto si se espera lluvia dentro de un periodo de 6 horas después de la aplicación. No aplicar cuando hay riesgo de deriva por viento hacia vegetación que no es objetivo de la aplicación. No aplicar a través de ningún tipo de sistema de riego. No aplicar este producto en forma aérea.

FITOTOXICIDAD.

La aplicación debe ser dirigida a la maleza ya que es un herbicida no selectivo, por lo que puede causar daño al tejido verde (hojas y tallos) del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese sólo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx