



BUSTER ON®

Fungicida agrícola

Gránulos Dispersables En Agua

Producto registrado: **RSCO-FUNG-0301V-X0710-420-50.0**

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

BOSCALID: 2-cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida
(Equivalente a 500 g de i.a./Kg).

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, humectante y portador.

TOTAL.

% EN PESO

50.0

50.0

100.0

**PUEDEN SER NOCIVOS EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDEN SER NOCIVOS POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDEN SER NOCIVOS SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5 PRECAUCIÓN BANDA VERDE**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO:

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

BUSTER ON es un fungicida sistémico de amplio espectro, formulado como gránulos dispersables en agua. Se recomienda su uso para el control de las enfermedades que a continuación se mencionan:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Arándano Frambuesa Grosella Zarzamora Vid	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.8-1.2	SL	Realizar dos aplicaciones a intervalo de 7 días de manera preventiva, cuando se detecten los primeros síntomas y las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 650 – 750 L de agua /ha.
Fresa			0	
Berenjena Chile Tomate Verde Jitomate (tomate rojo) Papa Pimiento morrón	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.15-0.20	0	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas y las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ ha..
Berenjena Chile Tomate Verde Jitomate (tomate rojo)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0–1.2	0	Realizar dos aplicaciones foliares de manera preventiva a intervalo de 7 días, cuando las

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Papa Pimiento morrón				condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se presenten los primeros síntomas. Volumen de aplicación sugerido 350 - 450 L de agua/ha.
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía	Mancha foliar (<i>Corynespora cassicola</i>)	0.75-1.25	SL	Realizar tres aplicaciones foliares de manera preventiva a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas y las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 400 - 500 L de agua/ha.
Ajo Cebolla Cebollín Espárrago Poro	Moho gris (<i>Botrytis allii</i>)	0.8-1.2	7	Realizar dos aplicaciones foliares de manera preventiva a intervalo de 7 días, cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se presenten los primeros síntomas. Volumen de aplicación sugerido 650 - 750 L de agua/ha.
Azalea, Begonia, Cempasúchil, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia, Geranio, Gladiola, Jacinto, Nochebuena, Rosal, Tulipán	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.0-1.2	0	Realizar dos aplicaciones foliares de manera preventiva a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas y las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación 750 - 850 L de agua/ha.

***Intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha y SL= Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR (Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (ppm)
Ajo	5
Arándano	10
Azalea	Exento
Begonia	Exento
Berenjena	1.2
Calabacita	3
Calabaza	1.6
Cebolla	5
Cebollín	5
Cempasúchil	Exento
Chayote	3
Chile	1.2
Clavel	Exento
Crisantemo	Exento
Dalia	Exento
Espárrago	0.9
Frambuesa	10
Fresa	1.2
Gardenia	Exento

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



CULTIVO	LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (ppm)
Geranio	Exento
Gladiola	Exento
Grosella	13
Jacinto	Exento
Jitomate (tomate rojo)	1.2
Melón	0.6
Nochebuena	Exento
Papa	0.05
Pepino	0.5
Pimiento morrón	10
Poro	5
Rosal	Exento
Sandía	1.6
Tomate verde	1.2
Tulipán	Exento
Vid	8.5
Zarzamora	10

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el equipo de protección puesto (gorra de algodón, o sombrero; mascarilla contra polvos o mascarilla completa con cartucho respiratorio; lentes de seguridad, overol de algodón, guantes y botas de neopreno), abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare. Aplíquese en forma de aspersión usando cualquier tipo de equipo terrestre que asegure un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

CONTRAINDICACIONES. Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr), o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx