



MANIX®

Fungicida agrícola

Suspensión concentrada

Producto registrado: **RSCO-MEZC-FUNG-0370-0386-X0161-064-42.63**

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

FLUAZINAM: 3-Cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)- α,α,α -trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina.
(Equivalente a 400 g de i.a./L a 20°C).

AZOXISTROBIN: Metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pyrimidin-4-iloxi]fenil}-3-metoxiacrilato.
(Equivalente a 125 g de i.a./L a 20°C).

INGREDIENTES INERTES:

Humectante, dispersante, anticongelante, espesante, antiespumante, modificador reológico, conservador, regulador de pH y diluyente.

TOTAL.

% EN
PESO

32.48

10.15

57.37

100.00



NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **4 PRECAUCIÓN, BANDA AZUL**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

MANIX® es un fungicida formulado como suspensión concentrada que combina la acción de contacto de Fluazinam con la acción sistémica de Azoxistrobin dando un amplio espectro de control. Se recomienda su uso en los cultivos y contra las enfermedades que se indican en la tabla de abajo.

CULTIVO(S)	PLAGA(S)	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*	OBSERVACIONES
Calabacita Chayote Calabaza Pepino	Mildiu de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.50 – 1.00	5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx

CULTIVO(S)	PLAGA(S)	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*	OBSERVACIONES
Melón Sandía				enfermedad; volumen de aplicación sugerido 450 – 550 L de agua/ha.
Pepino Calabacita Calabaza Chayote Melón Sandía	Mancha foliar (<i>Alternaria cucumerina</i>)	0.40 – 0.60	5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al momento de detectar los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía	Damping-off (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	0.50 – 1.00	5	Realizar 2 aplicaciones “in drench” a la base de la planta a intervalo de 14 días, iniciar las aplicaciones al momento del trasplante (en suelos con antecedentes de infestación por los patógenos). Volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Chayote	Pudrición radical (<i>Fusarium oxysporum</i>)			
Cebolla Ajo Cebollín Poro	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.40 – 0.60	5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al momento de detectar los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.
Cebolla Ajo Cebollín Poro	Pudrición blanca (<i>Sclerotium cepivorum</i>)	0.50 – 1.00	5	Realizar 3 aplicaciones <i>en drench</i> a intervalo de 25 días, iniciar al momento del trasplante; volumen de aplicación sugerido 700 – 800 L de agua/ha.
Frijol	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.50 – 1.00	14	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Cacahuete Garbanzo Soya			21	
Papa	Costra negra (<i>Rhizoctonia solani</i>)	2.0 – 3.0	8	Realizar una aplicación en forma de aspersión sobre la semilla al fondo del surco antes de cubrirla; volumen de aplicación sugerido 250 – 350 L de agua/ha.
Papa	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.40 – 0.60	8	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 10 días al momento de detectar los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 450 – 550 L de agua/ha.
Berenjena Chile Pimiento morrón			10	
Jitomate (Tomate rojo) Tomate verde			3	
Jitomate (Tomate rojo)	Damping-off (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Pythium aphanidermatum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)	0.50 – 1.00	3	Realizar 2 aplicaciones “in drench” a la base de la planta a intervalo de 14 días, iniciar las aplicaciones al momento del trasplante (en suelos con antecedentes de infestación por los patógenos). Volumen de
Berenjena			10	
Chile			8	
Papa			10	

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



CULTIVO(S)	PLAGA(S)	DOSIS (L/ha)	INTERVALO DE SEGURIDAD (DÍAS)*	OBSERVACIONES
Tomate verde	Damping-off (<i>Fusarium oxysporum</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>)		3	aplicación sugerido 550 – 650 L de agua/ha.
Azalea Begonia Clavel Crisantemo Dalia Gardenia Geranio Gerbera Gladiola Jacinto Nochebuena Rosal Tulipán	Mancha negra (<i>Diplocarpon rosae</i>)	0.50 – 1.00	0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 450 – 550 L de agua/ha.
Rosal	Mildiu (<i>Peronospora sparsa</i>)	0.50 – 1.00	SL	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 10 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad en el cultivo; volumen de aplicación sugerido 350 – 450 L de agua/ha.

*() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL = Sin Límite.
TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 12 horas después de la aplicación.

LMR(Límite Máximo de Residuos):

CULTIVO	LMR Fluazinam (ppm)	LMR Azoxistrobin (ppm)
Ajo	0.2*	1
Azalea	EXENTO	EXENTO
Begonia	EXENTO	EXENTO
Berenjena	0.09	3
Cacahuete	0.02	0.2
Calabacita	0.07	0.3
Calabaza	0.07	0.3
Cebolla	0.2*	1
Cebollín	0.2*	7.5
Chayote	0.07	0.3
Chile	0.09	2
Clavel	EXENTO	EXENTO
Crisantemo	EXENTO	EXENTO
Dalia	EXENTO	EXENTO
Frijol	0.05	0.5
Garbanzo	0.04	0.5
Gardenia	EXENTO	EXENTO
Geranio	EXENTO	EXENTO
Gerbera	EXENTO	EXENTO



Gladiola	EXENTO	EXENTO
Jacinto	EXENTO	EXENTO
Jitomate (Tomate rojo)	1.5	0.2
Melón	0.07*	0.3
Nochebuena	EXENTO	EXENTO
Papa	0.02	0.03
Pepino	0.07	0.3
Pimiento morrón	0.09	3
Poro	0.2*	7.5
Rosal	EXENTO	EXENTO
Rosal	EXENTO	EXENTO
Sandía	0.07	0.3
Soya	0.1*	0.5
Tomate verde	1.5	0.2
Tulipán	EXENTO	EXENTO

Fuente: COFEPRIS, *EPA

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Agite el envase del producto antes de abrirlo. Con el uso del equipo de protección personal listado en la sección **“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”**, abra el envase, desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES.

Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No se aplique en horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hr), o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD.

Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD.

No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx