



PRESAGE MAX®

Insecticida agrícola

Concentrado emulsionable

Producto registrado: **RSCO-MEZC-INAC-1103L-0104A-X0200-09-4.5**

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:

LUFENURON: (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi)fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

(Equivalente a 30 g de i.a./L a 20°C).

CLORANTRANILIPROL: 3-bromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2'-metil-6'-(metilcarbamoil)pirazol-5-carboxanilida

(Equivalente a 12 g de i.a./L a 20°C).

INGREDIENTES INERTES:

Emulsificantes, co-solvente, solvente y vehículo.

TOTAL.

% EN
PESO

3.20

1.30

95.50

100.00

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: **5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE.**

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PRESAGE MAX® es un insecticida CE que combina los efectos del lufenuron que actúa por ingestión y tiene efecto ovicida; y del clorantraniliprol que es un larvicida sistémico y de acción translaminar. Se recomienda su uso en los cultivos y para el control de las plagas descritas a continuación:

CULTIVO(S)	PLAGA(S)	DOSIS L/ha	INTERVALO DE SEGURIDAD (Días)*	OBSERVACIONES
Brócoli Col Col de Bruselas	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	0.75 – 1.25	5	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Coliflor	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)		11	

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



CARTA TÉCNICA

Jitomate Berenjena Chile Papa Pimiento Tomate verde	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano del fruto (<i>Helicoverpa zea</i>)	0.75 – 1.25	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 500 - 600 L de agua/ha.
Maíz Arroz Avena Cebada Centeno Sorgo Trigo	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.75 – 1.25	30	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 5 días, iniciar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 500 – 600 L de agua/ha.
Manzano Peral	Palomilla de la manzana (<i>Cydia pomonella</i>)	0.75 – 1.25	14	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Melón Calabaza Chayote Pepino Sandía	Gusano barrenador del melón (<i>Diaphania hyalinata</i>)	0.75 – 1.25	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Calabacita	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)		3	
Papa	Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>)	0.75 – 1.25	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 300 – 400 L de agua/ha.
Rosal Azalea Begonia Clavel Crisantemo Dalia Gardenia Geranio Gerbera Gladiola Jacinto Nochebuena Tulipán	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.75 – 1.25	0	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.

*() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de aplicado el producto.
LMR (Límite Máximo de Residuos):

Cultivo	LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (mg/kg)			
	Lufenuron		Clorantraniliprol	
	LMR	FUENTE	LMR	FUENTE
Arroz	0.01	COFEPRIS	0.04	COFEPRIS
Avena	0.01	COFEPRIS	0.02	COFEPRIS
Azalea	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Begonia	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Berenjena	0.4	COFEPRIS	1.4	COFEPRIS
Brócoli	0.02	COFEPRIS	4	COFEPRIS
Calabacita	0.09	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Calabaza	0.09	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Cebada	0.01	COFEPRIS	0.02	COFEPRIS

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídico.
C.P.10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



Cultivo	LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUOS (mg/kg)			
	Lufenuron		Clorantulaniliprol	
	LMR	FUENTE	LMR	FUENTE
Centeno	0.01	COFEPRIS	0.02	COFEPRIS
Chayote	0.09	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Chile	0.8	COFEPRIS	1.4	COFEPRIS
Clavel	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Col	0.02	COFEPRIS	4	COFEPRIS
Col de bruselas	0.02	COFEPRIS	4	COFEPRIS
Coliflor	0.02	COFEPRIS	4	COFEPRIS
Crisantemo	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Dalia	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Gardenia	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Geranio	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Gerbera	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Gladiola	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Jacinto	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Jitomate	0.4	COFEPRIS	1.4	COFEPRIS
Maíz	0.01	COFEPRIS	0.04	COFEPRIS
Manzano	1	COFEPRIS	1.2	COFEPRIS
Melón	0.4	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Nochebuena	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Papa	0.01	COFEPRIS	0.3	COFEPRIS
Pepino	0.09	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Peral	1	COFEPRIS	1.2	COFEPRIS
Pimiento	0.8	COFEPRIS	1.4	COFEPRIS
Rosal	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO
Sandía	0.09	COFEPRIS	0.5	COFEPRIS
Sorgo	0.01	COFEPRIS	6	COFEPRIS
Tomate	0.4	COFEPRIS	1.4	COFEPRIS
Trigo	0.01	COFEPRIS	0.02	COFEPRIS
Tulipán	EXENTO	EXENTO	EXENTO	EXENTO

Ornamentales Exentos de conformidad con el punto 1.2.2.1.1 de la NOM-082-SAG-FITO/SSA1-2017 donde indican que quedan exentos del cumplimiento de esta norma las plantas ornamentales

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Con el equipo de protección adecuado y completo, descrito en el apartado de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO, abra el envase desenroscando la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior y retírela totalmente, invierta la tapa y colóquela en la parte superior de la boca del envase, insertando la pestaña sobre el sello de seguridad interior, gire varias veces hasta romper este sello. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Mida con una probeta de plástico, o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a utilizar. Haga una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario, para lo cual llene con agua la mitad del tanque (tambo) o depósito de la aspersora, agregue la dosis

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®

www.dragon.com.mx



recomendada del producto, agite perfectamente y adicione la cantidad de agua restante. Agite continuamente. Aplique la mezcla el mismo día en que la prepare.

CONTRAINDICACIONES.

No exceda las dosis recomendadas en esta etiqueta para los cultivos que aquí se recomiendan. No aplique cuando el viento sea muy fuerte (>15 km/hr.), ni a temperaturas muy altas ($>35^{\circ}\text{C}$). No aplique cuando exista alta probabilidad de lluvia, puede ocasionar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD. Este producto no es fitotóxico en el cultivo y a las dosis recomendadas en esta etiqueta y bajo las instrucciones de uso dadas anteriormente.

INCOMPATIBILIDAD. No mezclar con otros productos, aplíquese solo.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”

Corporativo San Jerónimo

Periférico Sur No. 3325. Piso 3, San Jerónimo Lídice.
C.P. 10200. La Magdalena Contreras. Ciudad de México, México.
Tel.: 01 (55) 5089 1500 al 59 / 01 800 0211 568

Planta Lerma

Carretera México - Toluca km 52.5,
Col. Parque Industrial Lerma, Lerma Edo. de México.
C.P. 52000. Tel.: 01 (728) 285 1867 / 01 (728) 285 1623

Planta Puebla

Km. 5, Carretera Las Bocas S/N
Izúcar de Matamoros, Puebla. C.P. 74400.
Tel.: 01 (243) 432 6256 / 01 (243) 432 6271

DRAGON®www.dragon.com.mx